



Amounagro For Agriculture Investment

٥- سمات كير صوديوم

معالج لملوحة التربة يعمل علي طرد كاتيون الصوديوم واحلال الكالسيوم محلة وبالتالي يخفض تركيز الأملاح حول الجذور، يحتوي علي أحماض كربوكسيلية متعددة مجاميع الكربوكسيل والتي لها دور في تحسين قوام وبناء التربة.

أحماض كربوكسيلية	أكسيد كالسيوم
%٤٠	%٨

معدل الإستخدام: تسميد أرضي: ٢كجم/فدان

٦- سمات كير ليف

يحتوي علي نسبة عالية من الأزوت والأحماض العضوية المتخصصة في زيادة النموات الخضرية ومساحة سطح الورقة وزيادة المادة الجافة.

نيتروجين: ٢٠%	بورون: ٠.٠٢%	نحاس: ٠.٠٥%
حديد: ٠.١%	منجنيز: ٠.٠٥%	زنك: ٠.٠٥%

معدل الاستخدام:

تسميد أرضي: ٢ كجم / فدان رش ورقي: ٣-٥ جم/لتر

٧- سمات كير ميكس

يحتوي علي خليط من العناصر الهامة معقده علي أحماض أمينية سريع الأمتصاص والتمثيل داخل النبات.

نيتروجين: ١٠%	أكسيد ماغنسيوم: ١.٥%	موليبدينم: ٠.٢%	نحاس: ٠.٥%
حديد: ٢%	زنك: ٢%	منجنيز: ١.٣%	بورون: ١%

معدل الإستخدام: رش ورقي: ٢-٣ جم/لتر

٨- سمات كير فاينال

مركب طبيعي فريد تم تصنيعة بتكنولوجيا متطورة معتمدة علي أبحاث علمية حديثة يحتوي علي أحماض عضوية وكربوكسيلية لتحفيز الصبغات لسرعة التلوين والنضج، يعمل كمحفز لتنشيط تكوين الهرمونات النباتية الطبيعية.

أكسيد بوتاسيوم	أحماض كربوكسيلية	أحماض عضوية
%٣٥	%١٠	%١٠

معدل الإستخدام:

- تسميد أرضي: ٢كجم/فدان
- رش ورقي: ثلاث مرات الاولى قبل التلوين بشهر بتركيز ٣ جم /لتر والثانية عند ٣٠% بتركيز ٥ جم /لتر تلوين والثالثة عند ٥٠% تلوين بتركيز ٧ جم /لتر

أولاً: مجموعة الأسمدة المتخصصة

جيل جديد من الأسمدة متخصصة في صورة جيل عالية التركيز تقدم حلول علمية لتغذية النبات وتوفير الحماية المتكاملة لضمان كفاءة الأمتصاص و الفاعلية داخل النبات.

١- سمات كير سيليك

مركب فريد من نوعه يضمن الحماية الأكيدة والفعالة للنبات ضد الإجهادات المختلفة (الحرارة، ملوحة، صقيع، أمراض..)، ويعمل علي زيادة مناعة النبات وزيادة حيويته، يزود فتره حفظ الثمار وزيادة صلابتها.

سيلكون	بوتاسيوم
%٢٢	%١١

معدل الاستخدام:

تسميد أرضي: ٢ كجم / فدان رش ورقي: ٢-٧ جم/لتر

٢- سمات كير روت

منشط جذري قوي يتميز بإحتوائه علي أحماض أمينية وأحماض عضوية متخصصة تعمل علي زيادة نمو وتحفيز تكوين الجذور في النبات وله تأثير معزز ضد الإجهاد.

فوسفور: ١٢%	بوتاسيوم: ٦%	أندول بيوتريك أسيد: ٠.٢%	نحاس: ٠.٠٥%
حديد: ٠.٢%	زنك: ١%	منجنيز: ٠.٠٥%	بورون: ٠.٠٢%

معدل الاستخدام:

تسميد أرضي: ٢ كجم / فدان الشتلات: ١ جم /لتر ماء سقي في الجذر

٣- سمات كير هيوميك

منتج طبيعي يحتوي علي أحماض الهيوميك والفولفيك مستخلص بتقنيات حديثة لزيادة كفاءة وتأثيره بالتربة و النبات، يساعد علي تنشيط الجذور.

أكسيد بوتاسيوم	هيوميك وفولفيك أسيد
%١٠	%٢٠

معدل الاستخدام: تسميد أرضي: ١ كجم/فدان

٤- سمات كير أمينو

يتميز بإحتوائه علي نسبة مرتفعة من الأحماض الأمينية الحرة ومنتشطات ومحفزات نمو، يعمل كمستط فسيولوجي ومحفز لنمو النبات خصيصاً أوقات الأجهاد، زيادة جودة المحصول، يرفع انتاجية الفدان

أحماض أمينية	نيتروجين	فوسفور
%٢٠	%١٠	%٥

معدل الاستخدام:

تسميد أرضي: ١-٢ كجم / فدان رش ورقي: ٢-٣ جم /لتر

٩-سمارت كير جارد

مركب طبيعي يحتوي علي مستخلصات نباتية وأحماض عضوية ذو فعالية أكيدة في مقاومة النيماتودا، أمن وفعال في الزراعات العضوية متخصصة لدعم وحماية الزراعات من ديدان النيماتودا

أكسيد بوتاسيوم	مستخلصات نباتية
%١٠	%٥

معدل الاستخدام : تسميد أرضي: ٢كجم

١٠- سمارت كير بي انش

يعمل علي تقليل حموضة التربة ومحلل الري حيث أن حموضة المركب pH أقل من ١، يقوم بضبط pH محلول الرش لزيادة كفاءة امتصاص العناصر وكذلك يزيد كفاءة تأثير المبيدات.

نيتروجين كلي	ثالث أكسيد الكبريت
%٢٢	%٦٠

معدل الاستخدام :

تسميد أرضي: ٠.٥ كجم/فدان رش ورقي: ٠.٥ سم/لتر

١١-سمارت كير فلور

منتج متميز ذو تأثير سريع لتحسين التزهير وعقد الثمار لجميع أنواع المحاصيل، يحتوي علي مواد منشطة للنمو تعمل علي زيادة التزهير.

فوسفور: ١٦%	نفتالين أسيتك أسد: ٠.٠١%	بورون: ٠.٥%
حديد: ٠.٣%	منجنيز ٠.٠٥%	زنك: ٢.٥%
	نحاس: ٠.٠٥%	

معدل الاستخدام :

رش ورقي: يستخدم مرتين الاولى قبل مرحلة التزهير والثانية عند ٤٠%تزهير بمعدل ٣ لتر/كجم.

١٢-سمارت كير كالسيوم

يحتوي علي كالسيوم مخلب علي أحماض كربوكسيلية، خالي من الأزوت يستخدم في المراحل الحرجة (الأزهار - العقد..)

أكسيد كالسيوم	بورون
%٩	%١

معدل الاستخدام:

تسميد أرضي: ٣ كجم /فدان رش ورقي: ٣-٥ كجم/لتر

١٣-نترات كالسيوم سائلة

نترات كالسيوم حامضية التأثير سريعة الامتصاص يعمل علي تخفيف الملوحة ويزيد من الصلابة في الجذور والساق

أكسيد كالسيوم	نيتروجين
%١٨-١٦	%١٠

معدل الاستخدام: تسميد أرضي: ٥ كجم/فدان

١٤-سمارت كير سايزينج

مركب طبيعي متخصص لزيادة الحجم الثمار يحتوي علي مجموعة من الانزيمات الطبيعية والفيتامينات، يعمل علي تحسين مواصفات الجودة من حيث (السكر - الطعم - النكهة - اللون).

أكسيد بوتاسيوم	أحماض كربوكسيلية	أحماض عضوية
%٣٣	%٢٠	%١٠

معدل الاستخدام:

رش ورقي: ٣-٥ كجم /لتر تسميد أرضي: ٢ كجم /فدان

١٥-سمارت كير حديد

يحتوي علي حديد سريع الامتصاص معقد علي أحماض أمينية وعضوية للوقاية والعلاج من نقص عنصر الحديد

حديد	أكسيد ماغنسيوم
%٦	%١

معدل الاستخدام: رش ورقي: ٢-٣ كجم/لتر

١٦- سمارت كير منجنيز

يحتوي علي منجنيز سريع الامتصاص معقد علي أحماض أمينية وعضوية للوقاية والعلاج من نقص عنصر المنجنيز

منجنيز	زنك
%٦	%١

معدل الاستخدام: رش ورقي: ٢-٣ كجم/لتر

١٧- سمارت كير زنك

يحتوي علي زنك سريع الامتصاص معقد علي أحماض أمينية وعضوية للوقاية والعلاج من نقص عنصر الزنك

زنك	منجنيز
%٦	%١

معدل الاستخدام: رش ورقي: ٢-٣ كجم/لتر

١٨- نترات ماغنسيوم سائلة

نترات ماغنسيوم سائلة حامضية التأثير سريعة الإمتصاص، يعمل علي زيادة معدلات بناء الكلورفيل والتمثيل الضوئي.

أكسيد ماغنسيوم	نيتروجين
%١٥	%١١

معدل الاستخدام: تسميد أرضي: ٥ كجم /فدان

١٩- نترات نشادر سائلة ٣٥%

نيتروجين	%٣٥
----------	-----

معدل الاستخدام: تسميد أرضي: ٥ كجم/فدان

ثانياً: مجموعة الأسمدة المركبة

أسمدة مركبة ذات تأثير حامضي تامة الذوبان في الماء تمتاز بسرعة إمتصاصها داخل النبات وتلائم جميع مراحل نمو النبات مصنعه من خامات عالمية عالية الجودة خالية من الأملاح الضارة تصلح لأستخدام مع جميع نظم الري والرش الورقي

١- ماكروفيد ١٨/١٨/١٨

سماد مركب متوازن NPK يستخدم خصيصاً لمراحل النمو الخضري والجذري في النبات يتميز بإحتوائه علي ماغنسيوم وأحماض أمينية و منشطات نمو

نيتروجين	فوسفور	بوتاسيوم	أكسيد ماغنسيوم
%١٨	%١٨	%١٨	%٠.٥

معدل الإستخدام: تسميد أرضي: ٢-٤ كجم/فدان رش ورقي: ١-٢ جم/لتر

٢- ماكروفيد ١٩/١٩/١٩

سماد مركب متوازن يحتوي علي العناصر الكبرى ومحفزات نمو لزيادة المجموع الخضري والجذري للنبات يتميز بأنه خالي من السلفات والكلوريد.

نيتروجين	فوسفور	بوتاسيوم
%١٩	%١٩	%١٩

معدل الإستخدام: تسميد أرضي: ٢-٤ كجم/فدان رش ورقي: ١-٣ جم/لتر

٣- ماكروفيد ٢٠/٢٠/٢٠

سماد مركب متوازن يحتوي علي العناصر الكبرى ومحفزات نمو لزيادة المجموع الخضري والجذري للنبات.

نيتروجين	فوسفور	بوتاسيوم	أكسيد ماغنسيوم
%٢٠	%٢٠	%٢٠	%٠.٥

معدل الإستخدام: تسميد أرضي: ٢-٤ كجم/فدان رش ورقي: ١-٣ جم/لتر

٤- ماكروفيد ٤٥/٠/١٣

سماد مركب عالي البوتاسيوم يتميز بأحتوائه علي أعلى نسبة نترات بوتاسيوم بالإضافة إلي منشطات ومحفزات نمو طبيعية يعمل علي زيادة حجم الثمار وتحسين مواصفات الجودة يستخدم رشاً لكسر طور السكون في أشجار الفاكهة بديلاً لدوروميكس.

نيتروجين	بوتاسيوم
%١٣	%٤٥

معدل الإستخدام: تسميد أرضي: ٥ كجم/فدان رش ورقي: ١-٢ جم/لتر

٥-ماكروفيد ٤٢/٦/٦

سماد مركب عالي البوتاسيوم يتميز بأحتوائه علي نسبة عالية من نترات بوتاسيوم بالإضافة إلي منشطات نمو طبيعية متخصص لزيادة حجم الثمار وتحسين مواصفات الجودة

نيتروجين	فوسفور	بوتاسيوم
%٦	%٦	%٤٢

معدل الإستخدام: تسميد أرضي: ٥ كجم/فدان رش ورقي: ٢-٥ جم/لتر

٦-ماكروفيد ٣٦/٦/١٢

سماد مركب عالي البوتاسيوم يتميز بأحتوائه علي نترات بوتاسيوم، بالإضافة إلي منشطات نمو طبيعية متخصص لزيادة حجم الثمار وتحسين مواصفات الجودة.

نيتروجين	فوسفور	بوتاسيوم
%١٢	%١٢	%٣٦

معدل الإستخدام: تسميد أرضي: ٥ كجم/فدان رش ورقي: ١-٢ جم/لتر

٧-ماكروفيد ١١/٥٠/١١

سماد مركب NPK عالي الفوسفور متخصص لتقوية وتحفيز نمو الجذور ويساعد علي نجاح عمليتي التزهير والعقد.

نيتروجين	فوسفور	بوتاسيوم
%١١	%٥٠	%١١

معدل الإستخدام: تسميد أرضي: ٥ كجم/فدان رش ورقي: ٢ جم/لتر

٨- ماكروفيد ١٥/٣٠/١٥

سماد مركب NPK يحتوي علي نسبة مرتفعة من الفوسفور ونسب متزنة من الأزوت والبوتاسيوم مما يساعد النبات علي تنشيط عملية العقد والتزهير بصورة جيدة وتحسين نمو الجذور وفي نفس الإتجاه يعمل علي تحجيم الثمار.

نيتروجين	فوسفور	بوتاسيوم
%١٥	%٣٠	%١٥

معدل الإستخدام: تسميد أرضي: ٥ كجم/فدان رش ورقي: ٢-٣ جم/لتر

٩-برايت ١٩/١٩/١٩

سماد مركب متوازن يحتوي علي العناصر الكبرى ومحفزات نمو لزيادة المجموع الخضري والجذري للنبات.

نيتروجين	فوسفور	بوتاسيوم
%١٩	%١٩	%١٩

معدل الإستخدام: تسميد أرضي: ٢-٤ كجم/فدان رش ورقي: ١-٣ جم/لتر

١٠-برايت ٤٠/٥/٥

سماد مركب عالي البوتاسيوم يتميز بأحتوائه منشطات نمو طبيعية متخصص لزيادة حجم الثمار وتحسين مواصفات الجودة

نيتروجين	فوسفور	بوتاسيوم
%٥	%٥	%٤٠

معدل الإستخدام: تسميد أرضي: ٥ كجم/فدان رش ورقي: ٢-٥ جم/لتر

رابعاً: مجموعة ميكروفيد عناصر صغري

أسمدة سريعة وسهلة الإمتصاص مناسبة للأراضي المصرية القلوية للوقاية والعلاج من نقص العناصر.

١- ميكروفيد حديد ١٠%

مصصح سريع وفعال لنقص الحديد في النبات، حيث أنه أساسي في تكوين الكلورفيل وإنزيمات التنفس.

حديد مخلب على صورة إديتا (EDTA)	١٠%
معدل الاستخدام : رش ورقي: ١ جم/لتر	

٢- ميكروفيد منجنيز ١٠%

مصصح سريع وفعال لنقص المنجنيز في النبات، حيث أنه منشط لإنزيمات التنفس ويدخل في تكوين البروتين .

منجنيز مخلب على صورة إديتا (EDTA)	١٠%
معدل الاستخدام :	

تسميد أرضي : ٣٠٠-٥٠٠ جم/فدان رش ورقي: ١ جم/لتر

٣- ميكروفيد زنك ١٠%

مصصح سريع وفعال لنقص الزنك في النبات، حيث أنه هام لأنبات حبوب اللقاح وبالتالي زيادة المحصول ويلعب دور هام في تكوين الأحماض الأمينية .

زنك مخلب على صورة إديتا (EDTA)	١٠%
معدل الاستخدام :	

تسميد أرضي : ٣٠٠-٥٠٠ جم/فدان رش ورقي: ١ جم/لتر

٤- ميكروفيد نحاس ١٠%

مصصح سريع وفعال لنقص النحاس في النبات.

نحاس مخلب على صورة إديتا (EDTA)	١٠%
معدل الاستخدام :	

تسميد أرضي : ٣٠٠-٥٠٠ جم/فدان رش ورقي: ١ جم/لتر

٥- ميكروفيد بورون ١٢%

بورون عضوي سريع وسهل الأمتصاص بواسطة الأوراق والجذور من أفضل صور البورون للنبات ، يدفع النبات لزيادة التزهير والتبكير في النضج.

بورون معقد علي إيثانول أمين	١٢%
معدل الاستخدام :	

تسميد أرضي : ٢٠٠-٥٠٠ جم/فدان رش ورقي: ٠.٢٥-١ جم/لتر

٦- كبريتات نحاس ٢٥%

نحاس	٢٥%
------	-----

معدل الاستخدام :

تسميد أرضي : ٢٥٠-٥٠٠ جم/فدان مطهر فطري: ١-٠.٥ كجم

ثالثاً: مجموعة الأسمدة المعلقة

الجبل الجديد من الأسمدة المركبة في صورته معلق ذات تأثير حامضي ودرجة نقاوة عالية ،درجة ثبات عالي سريعة الإمتصاص داخل النبات، ذات تركيبات مختلفة تتلائم وتوفر احتياجات النبات في مراحل النمو المختلفة لكافة المحاصيل لضمان الجودة وزيادة الإنتاج.

١- ماكروفيد ٢٢/٢٢/٢٢ + TE

سماد معلق متوازن يحتوي علي العناصر الكبرى والصغري المخلية ومحفزات نمو لزيادة المجموع الخضري والجذري للنبات.

نيتروجين	فوسفور	بوتاسيوم	أكسيد ماغنسيوم
٢٢%	٢٢%	٢٢%	٠.٥%

معدل الاستخدام :

تسميد أرضي : ٣-٥ كجم/فدان رش ورقي: ٣-٥ جم/لتر

٢- ماكروفيد ٦٠/٠/٦ + TE

سماد معلق عالي البوتاسيوم يتميز بأحتوائه علي نترات بوتاسيوم بالإضافة إلي منشطات نمو طبيعية متخصص لزيادة حجم الثمار وتحسين مواصفات الجودة

نيتروجين	بوتاسيوم
٦%	٦٠%

معدل الاستخدام :

تسميد أرضي : ٣-٥ كجم/فدان رش ورقي: ٢-٣ جم/لتر

٣- ماكروفيد ٢٥/٥٠/٠ + TE

سماد معلق يحتوي علي نسبة مرتفعة من الفوسفور ونسبه من البوتاسيوم مما يساعد النبات علي تنشيط عملية العقد والتزهير بصورة جيدة وتحسين نمو الجذور وفي نفس الإتجاه يعمل علي تحجيم الثمار. البديل الأفضل للمونو بوتاسيوم فوسفات.

فوسفور	بوتاسيوم
٥٠%	٢٥%

معدل الاستخدام :

تسميد أرضي : ٣-٥ كجم/فدان رش ورقي: ٢ جم/لتر

٤- ماكروفيد ١٠/٥٠/١٠ + TE

سماد معلق NPK عالي الفوسفور متخصص لتقوية وتحفيز نمو الجذور ويساعد علي نجاح عمليتي التزهير والعقد.

نيتروجين	فوسفور	بوتاسيوم
١٠%	٥٠%	١٠%

معدل الاستخدام :

تسميد أرضي : ٣-٥ كجم/فدان رش ورقي: ٢ جم/لتر

٥- ماكروفيد ٠/٠/٣٣ + TE

نيتروجين	٣٣%
----------	-----

معدل الاستخدام : تسميد أرضي : ٥ كجم/فدان